


概率模型

随机试验 (trial) 样本空间 Ω (outcome) 信念分布 belief

样本空间的试验结果必须满足互斥且完整。(可能有限个或无限个)

· 样本空间 (离散/连续):

例 连续模型. 甲和乙约定见面, 每个人随机迟到 0-1 小时.



分配概率:

(定义) 事件: 样本空间的子集, 某些试验结果的集合, 可以用“是否发生”描述.

若试验结果为 ω , 事件记为 $A: \omega \in A$ 表示试验中事件发生, $\omega \notin A$ 则不发生.

概率公理 1° (非负性) 对任意事件 A , $P(A) \geq 0$.

2° (归一化) $P(\Omega) = 1$.


3° (可加性) 若 $A \cap B = \emptyset$, 那么 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

证明 $P(A) \leq 1$: $A \cup A^c = \Omega$, $A \cap A^c = \emptyset$. $P(A) + P(A^c) = 1$ 且 $P(A) \geq 0$, $P(A) \leq 1$.

补充: $P(\{s_1, \dots, s_k\}) = P(\{s_1\}) + \dots + P(\{s_k\}) = P(s_1) + \dots + P(s_k)$. (有限可加)

概率的实质: 为事件确定一个非负数 $P(A)$, 相当于一个映射.

例 约会模型进阶: 若甲、乙最多等待对方 15 分钟, 则他们能够相遇的概率多大?



阴影部分表示有概率相遇. $P(\text{相遇}) = \frac{7}{16}$.

(悖论原因: 没有明确“等可能”概念)

Bertrand 悖论: 在半径为 1 的圆内任取一条弦, 求弦长大于 $\sqrt{3}$ 的概率.

如果认为弦的端点等可能落在圆周上: 固定一个端点, 从角度考虑 $P = 1/3$.

如果认为弦中点等可能地落在与之垂直的直径上: $P = 1/2$.

如果认为弦中点等可能落在圆内, 考虑面积: $P = 1/4$.

公理 3 从有限可加推广到可列可加: 若 $A_1, A_2, \dots$ 互不相交, $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$

可列的实质: 与自然数集一一对应, 可数无穷.

概率性质 (只能使用推广后的 3 条公理)

性质 1. $P(\emptyset) = 0$. 证明: $\Omega = \Omega + \emptyset + \emptyset + \dots$, $P(\Omega) = P(\Omega) + P(\emptyset) + \dots$,

$0 = P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots$, 则 $P(\emptyset) = 0$.

性质2° 有限可加性 事件 $A_i, i=1, \dots, n$, 且 $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$, 则 $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$.

(证明) 令 $A_{n+1} = A_{n+2} = \dots = \emptyset$, 则 $\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, 且 $i \neq j$ 时 $A_i \cap A_j = \emptyset$.

由公理3和性质1, $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$.

性质3° $P(A^c) = 1 - P(A)$. $1 = P(\Omega) = P(A \cup A^c) = P(A) + P(A^c)$.

性质4° 若 $A \subset B$, 则 $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$.

证明: $B = A \cup (B \setminus A)$ 且 $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$. 用性质2° 可得.

推论: (概率单调性) 若 $A \subset B$, 则 $P(A) \leq P(B)$; 对任意事件, $0 \leq P(A) \leq 1$.

性质5° $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

证明: $P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A) = P(A) + P(B \setminus (A \cap B)) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

推论: 有限次可加性 finite subadditivity / Boole's inequality: $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$

性质6° the inclusion-exclusion formula 容斥恒等式

$$P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i \cap A_j \cap A_k) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)$$

证明: (利用互斥, 归纳法) 设 $P_k = \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n} P(A_{j_1} \cap \dots \cap A_{j_k})$, $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} P_k$.

归纳法: $k=n-1$ 时 $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = P(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i) + P(A_n) - P(\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i \cap A_n)$

其中 $(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i) \cap A_n = \bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i \cap A_n) = \bigcup_{i=1}^{n-1} B_i$. (交集变并集)

$$q_k = \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n-1} P(B_{j_1} \cap \dots \cap B_{j_k}) = \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n-1} P(A_{j_1} \cap \dots \cap A_{j_k} \cap A_n). \quad (\text{替换形式})$$

$P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k-1} P'_k + \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k q_k$. 相当于: 前 $n-1$ 项内概率 + 一定含 A_n 项的概率

$$\rightarrow P_k = P'_k + q_{k-1}. \quad (-1)^{n-1} q_{n-1} = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} q_{k-1}.$$

$$\rightarrow = \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k-1} (P'_k + q_{k-1}) + (-1)^{n-1} P_n = \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k-1} P'_k + (-1)^{n-1} P_n.$$

性质7° (Bonferroni's inequality) $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) \geq \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j)$

(Kounias inequality) $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) \leq \min_k \left\{ \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i: i \neq k} P(A_i \cap A_k) \right\}$.

性质8° 可列次可加性 σ -subadditivity) $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

证明: 令 $B_1 = A_1$, $B_n = A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i$, 则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$ 且 $B_i \cap B_j = \emptyset, i \neq j$.

由公理(3)和单调性, $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = P(\bigcup_{i=1}^n B_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$.

性质9° $P(\bigcap_{i=1}^n A_i) \geq 1 - \sum_{i=1}^n P(A_i^c)$, 特别地, $P(A_1 \cap A_2) \geq 1 - P(A_1^c) - P(A_2^c)$.

证明: $P(\bigcap_{i=1}^n A_i) = 1 - P((\bigcap_{i=1}^n A_i)^c) = 1 - P(\bigcup_{i=1}^n A_i^c) \geq 1 - \sum_{i=1}^n P(A_i^c)$.

令 $A_3 = A_4 = \dots = \Omega$ 即可得第2个结论.

处理证明3大技巧: 互斥, 求补, 归纳法

问题解决思路: 序贯树
递归 + 边界条件

匹配问题补充

例 翻牌匹配问题 (古典概型) 一共有 n 张牌, n 个数, 依次翻开, 有一张匹配即可。

$$P(A_1) = \frac{1}{n}, (\text{第一张匹配}) \quad P(A_1 A_2) = \frac{1}{n(n-1)} (\text{第1, 2张均匹配}) \dots$$

由对称性, 有两张匹配的概率为 $P(A_i A_k) = \frac{1}{n(n-1)}$ 。

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \frac{1}{n} C_n^1 - \frac{1}{n(n-1)} C_n^2 + \frac{1}{n(n-1)(n-2)} C_n^3 + \dots = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \dots - \frac{(-1)^{n+1}}{n!}$$

实际上是 $1 - e^{-1}$ 的 Taylor 展开。 (收敛到定值)

随机抽样与随机分配

性质: 有放回 / 无放回, 有序 / 无序。含有 M 个箱子的箱子里抽 n 次。

放回有序: $\Omega = \{w: w = (a_1, \dots, a_n), a_i \in \{1, 2, \dots, M\}\}, \#(\Omega) = M^n$ 。

放回无序: $\Omega = \{w: w = [a_1, \dots, a_n], a_i \in \{1, 2, \dots, M\}\}, \#(\Omega) = C_{M+n-1}^n = \binom{M+n-1}{n}$ 。

不放回有序: $\Omega = \{w: w = (a_1, \dots, a_n), a_k \neq a_l, k \neq l, a_i \in \{1, 2, \dots, M\}\}, \#(\Omega) = P_M^n = \frac{M!}{(M-n)!}$ 。

不放回无序: $\Omega = \{w: w = [a_1, \dots, a_n], a_i \in \{1, 2, \dots, M\}\}, \#(\Omega) = \binom{M+n-1}{n}$ 。

随机抽样与随机分配的对应: 相当于按箱分配球, 有序 $\Leftrightarrow$ 球不同, 无序 $\Leftrightarrow$ 相同;

放回抽样 $\Leftrightarrow$ 可以一箱多球, 不放回抽样 $\Leftrightarrow$ 每箱最多一球

古典概型补充说明

$$\text{证明结论 } \binom{m}{n} = \binom{m-1}{n-1} + \binom{m-1}{n}.$$

方法1: $\binom{m}{n} = \sum_{k=0}^{m-1} \binom{m-1}{k}$, 可以证明有放回无序抽样的结论 $\binom{M+n-1}{n}$ 。

M 个球里抽 n 个 (有放回无序): 假设在 $M-1$ 个球时成立, 抽任意 n 个球有 $\binom{M+n-2}{n}$ 。

情景理解: 在前 $M-1$ 个球中抽 j 次 $\binom{j+M-2}{j}$, 抽第 M 个球 $(n-j)$ 次。

$$\sum_{j=0}^n \binom{j+M-2}{j} = \sum_{j=0}^n \binom{j+M-2}{M-2-j}. \text{ 接下来换元 } k = j+M-1, \text{ 原式} = \sum_{k=M-1}^{n+M-1} \binom{k}{M-1} = \binom{n+M}{M}.$$

因为 $\tilde{m} = n + \tilde{n} + 1$, 那么原式 = $\binom{n+M}{M}$ 得证。

例: m 个球 r 种颜色, 同色球相同 (每种球分别有 $n_1, n_2, \dots, n_r$) 求 m 个球的排列数。

(等价地, 把 m 个球放入 r 个盒子, 使 m_j 个球进入第 j 个盒子)

$$\text{结论: } \frac{m!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$$

古典概型技巧: 适度借助常识; 用最简单情形验证; 将 (所有) 物体编号;

情景证明 (story proof)

有限可加 $\rightarrow$ 可列可加, 但不能推广到不可列无限可加.

否则: 以在区域内找落点为例, $1 = P(\Omega) = P(\bigcup_{x,y} \{(x,y)\}) = \sum_{x,y} P(\{(x,y)\}) = 0$.

声明: $P(A) = 1$ 只能说“几乎必然”发生, 而非绝对一定 (比如 $x=0$ 在 $\mathbb{R}$ 轴上).
· 不是任意样本空间的子集都可以分配概率.

$\forall x, y \in [0,1]$, 定义等价关系 $x \sim y$ 当且仅当 $x-y \in \mathbb{Q}$, 将区间 $[0,1]$ 分割为了一些互不相交的等价类. 存在 $[0,1]$ 的一个子集 E , 由每个等价类中选取一个元素构成.

记 $\{r_n\} = [-1,1] \cap \mathbb{Q}$, 令 $E_n = r_n + E$ (E 的每个元素加 r_n). $m \neq n$ 时 $E_m \cap E_n = \emptyset$, 因为若 $\exists x \in E_m \cap E_n$, $x - r_m \in E$, $x - r_n \in E$, $(x - r_m) - (x - r_n) \in \mathbb{Q}$, 不符合 E 构造. 又 $[0,1] \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$.

假设 $P(E)$ 存在, 则 $P(E_n) = P(E)$ (平移不改变概率), 那么 $0 < P([0,1]) \leq P(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n) \leq P([-1,2]) < \infty$.

而由于 $\{E_n\}$ 互斥, $P(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(E_n)$, $P(E) = 0$, 矛盾. 故 E 不可分配概率.

已知: 有限范围内 $+ \cup \cap$ 运算结果可以度量, 现在希望推广到可列.

将可列转化到有限次交并补运算: $B_n = A_n - (A_1 + A_2 + \dots + A_{n-1}) = A_n \cap (A_1 \cup \dots \cup A_{n-1})^c$

那么可列并 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$, 可列并可以合理分配.

可列交可由可列并取补得到, 不改变其可以合理分配性质.

概率空间

定义事件域 $\mathcal{F}$, 表示 Ω 的某些子集的集合. 若 $\mathcal{F}$ 满足以下 3 个条件:

1° $\Omega \in \mathcal{F}$, 2° 若 $A \in \mathcal{F}$ 则 $A^c \in \mathcal{F}$, 3° 若 $A_n \in \mathcal{F}, n=1,2,\dots$ 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$.

则称 $\mathcal{F}$ 是 Ω 上的事件域或 σ -域或 σ -代数, $\mathcal{F}$ 中的元素为事件.

称 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是可测空间 (measurable space).

σ -代数例: $\mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset\}$, 平凡的 σ -代数; $\mathcal{F} = \{\Omega \text{ 的所有子集}\}$, 最大的 σ -代数

$\mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset, A, A^c\}$ 是含 A 的最小 σ -代数. 记作 $\mathcal{F} = \sigma(\{A\})$.

注意: Ω 的子集未必是事件, 只有 $\mathcal{F}$ 中元素为事件; $\mathcal{F}$ 对集合的各种运算都封闭, 包括极限.

例 若 A, B 是 Ω 的两个子集且 $B \neq A^c$, 则由 $\mathcal{A} = \{A, B\}$ 生成的 σ -域 $\mathcal{F}$ 是 $\{\Omega, \emptyset, A, A^c, B, B^c, AB, AB^c, A^cB, A^cB^c, A \cup B, A^c \cup B, A \cup B^c, A^c \cup B^c, AB \cup A^cB^c, AB^c \cup A^cB\}$.

封闭性补充: $\mathcal{F}, G$ 为两个 σ -域, 但 $\mathcal{F} \cup G$ 不一定是 σ -域.

若 $\mathcal{F}$ 和 G 是两个 σ -域, 且 $\mathcal{F} \subset G$ 则 $\mathcal{F} \cup G$ 是 σ -域.

(二元 $\rightarrow$ 三元)

定义: 概率或概率测度 (probability measure) $(\Omega, \mathcal{F})$ 是可测空间, P 是 $\mathcal{F}$ 上函数.

若满足: 1° (非负性) $\forall A \in \mathcal{F}, P(A) \geq 0$. 2° $P(\Omega) = 1$ (完全性)

3° (可列可加性) 对 $\mathcal{F}$ 中互不相交 (disjoint, 互斥) 的事件列, $P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$.

称 P 为 $\mathcal{F}$ 上的概率测度/概率, $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间.

说明: 当 Ω 有限或可列, 存在概率分配使 Ω 的任意子集都可测; 若 Ω 不可列, 则

其一定存在不可测子集, 不能被当作事件. 但即使事件存在, 也不一定能够计算概率.

规范表述: 若 $P(A) = 1$, 则 A 以概率 1 发生或几乎处处发生, 也叫几乎必然, 记作 a.s. (almost surely).

事件域 $\mathcal{F}$ / 可测空间 $(\Omega, \mathcal{F}) \neq$ 测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$:

事件域包含全部我们关心的事件, 且每一个事件都可以分配概率; 对同一个可测空间,

事件域, 可以构造不同的概率空间. 概率计算较困难时可以用上下界逼近.

概率的连续性

若 $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \dots$ 称事件列 $\{A_1, \dots\}$ 单调递增; $A_1 \supset A_2 \supset A_3 \dots$ 称单调递减. (单调序列)

单调有界 $[0, 1] \Rightarrow$ 有极限. 单增 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, 单减 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$.

定理: 对单调事件列 $\{A_n\}$, 无论单调递增还是单调递减, $P(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$.

证明: $\{A_i\}$ 单调增: $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 \cup \bigcup_{i=2}^{\infty} (A_i - A_{i-1})$ (拆成互斥)

$$P(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n) = P(A_1) + \sum_{i=2}^{\infty} (P(A_i) - P(A_{i-1})) = P(A_1) + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=2}^n (P(A_i) - P(A_{i-1})) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

$\{A_i\}$ 单调减: 基本同上, 拆成互斥后有其补集单调增.

$$1 - P(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n) = P(\lim_{n \rightarrow \infty} (\Omega - A_n)) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n), \quad P(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

(定义) 事件列的上极限与下极限 上极限 $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \{w \in \Omega: w \text{ 属于无穷个 } A_k\}$

(理解) $\forall n, \exists k \geq n$ s.t. $w \in A_k$. 下极限 $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$.

(理解) $\exists n_0, \forall k \geq n_0, w \in A_k$. 即 w 属于所有 A_k (无穷多), 除了有限个之外.

例: 考虑一种情况: 5 个人共同上课, $w_1 = VVV\dots, w_2 = OOVVV\dots,$

$$w_3 = VOVV\dots, w_4 = VVOOO\dots, w_5 = VOVOVO\dots$$

那么上极限为 $\{w_1, w_2, w_3, w_5\}$, 下极限为 $\{w_1, w_2, w_3\}$.

下极限可以看作一个核, 其范围小于上极限, 上极限相对松散.

$\limsup A_n$ 和 $\liminf A_n$ 都存在: $\lim A_n$ 不一定存在, 必须要求上下极限相等.

补性质: $\limsup A_n + \liminf A_n^c = \Omega$.

定理: 任意事件列 $\{A_i\}$, $P(\limsup A_n) \geq \limsup P(A_n)$, $P(\liminf A_n) \leq \liminf P(A_n)$.

(证明) 记 $B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$, 则 $\{B_n\}$ 是单调递减的. 有 $P(\limsup A_n) = P(\lim_{n \rightarrow \infty} B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n)$.

$P(B_n) \geq P(A_k)$, $\forall k \geq n$, 即 $P(B_n) \geq \sup_{k \geq n} P(A_k)$. $\limsup A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} \bigcup_{l=k}^{\infty} A_l = \lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \lim_{n \rightarrow \infty} B_n$

此时 $\sup_{k \geq n}$ 是关于 n 单调的数列, 不是事件列. 单调性保证了极限存在.

定理: Borel-Cantelli 引理 (BC 引理): 若 $\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) < \infty$, 则 $P(\limsup A_n) = 0$.

2° 若 $\{A_i\}$ 独立且 $\sum_{j=1}^{\infty} P(A_j) = \infty$, 则 $P(\limsup A_n) = 1$.

试验: 抽取一枚均匀硬币无穷多次, 记 H_n 表示第 n 次抽硬币得到正面.

$P(H_n) = \frac{1}{2}$, $P(\limsup H_n) = 1$, 即出现无穷多次正面的概率为 1.

而 $P(\liminf H_n) = 1 - P(\limsup H_n^c) = 0$, 即几乎不可能某时刻后一直为正面.

可以证明: $\liminf A_n + \limsup A_n^c = \Omega = \liminf A_n^c + \limsup A_n$.

条件概率

(定义) 概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $A, B \in \mathcal{F}$ 且 $P(A) > 0$, 则在 A 发生的条件下, B 发生的条件概率为 $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

$P(A) = 0$ 时相应的条件概率无定义, 有时可根据需要再定义 $P(B|A)$.

定理 (对应公理非负、归一、可加) $A \in \mathcal{F}$ 且 $P(A) > 0$:

1° $\forall B \in \mathcal{F}$, $P(B|A) \geq 0$. 2° $P(\Omega|A) = 1$.

3° 对互斥事件列 $\{B_i\}$, $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i | A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i | A)$.

用 $P_A(\cdot)$ 表示 A 发生的条件下的条件概率, 则 $(\Omega, \mathcal{F}, P_A)$ 也是一个概率空间. 若概率完全集中在 A 上, 也可以将 A 看成新的样本空间 $(A, A \cap \mathcal{F}, P_A)$. 所有概率性质对条件概率均适用.

条件概率依然是一个概率测度 $\Rightarrow$ 概率空间.

可以改号记号 $P_A(\bigcup_{i=1}^n B_i) = \sum_{i=1}^n \frac{P(B_i \cap A)}{P(A)} = \sum_{i=1}^n P_A(B_i)$.

大小关系: $P(B|A)$ 和 $P(B)$ 的大小关系不确定. (BCA 时 $P(B)$ 小; 互斥时 $P(B|A) = 0$)

乘法公式 $P(\bigcap_{i=1}^n A_i) = P(A_1) \prod_{i=2}^n P(A_i | A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{i-1})$.

公式可以任意换序, 所以其实是 $n!$ 个公式, 视情况选用.

例: 写信问题, n 封信随机装入 n 个有不同地址的信封, 考虑地址正确概率.

记 A_i 表示第 i 个信封上所写地址正确, $\bigcup_{i=1}^n A_i$ 表示至少有一个正确.

$q_0 = 1 - P(\bigcup_{i=1}^n A_i)$ 表示没有一个正确. 对 $\forall i \leq n$, $P(A_i) = \frac{1}{n} = \frac{(n-1)!}{n!}$.


$q_{0,n} \rightarrow n \uparrow$ 均不匹配. 现在想求 $P(\bigcup_{i=1}^n A_i)$: $\forall 1 \leq i < j \leq n$, $P(A_i A_j) = \frac{1}{n(n-1)} = \frac{(n-2)!}{n!}$,
 $\forall 1 \leq i < j < k \leq n$, $P(A_i A_j A_k) = \frac{(n-3)!}{n!}$. 以此类推, $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n!}$.
 $q_0 = \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots - \frac{(-1)^n}{n!} = \sum_{k=2}^n \frac{(-1)^k}{k!}$, 记为 $q_0(n)$. $\lim_{n \rightarrow \infty} q_0(n) = \frac{1}{e} \approx 0.37$.

考虑恰好有 r 封匹配 (即有 $n-r$ 封不匹配, $q_{0,n+r}$) 的概率. 不妨设正确的就是前 r 封, 事件相当于 "从 n 个不同编号的球中无放回地摸 r 个恰好依次摸得前 r 号": 前 r 封 $\frac{1}{n(n-1)\dots(n-r+1)}$.

后 $n-r$ 封 $q_{0,n+r} = \sum_{k=2}^n \frac{(-1)^k}{k!}$; 从 n 个信封里取 r 个组合有 $\binom{n}{r}$ 种取法, 故所求概率应为

$$q_r(n) = \binom{n}{r} \cdot \frac{1}{n(n-1)\dots(n-r+1)} \sum_{k=2}^n \frac{(-1)^k}{k!} = \frac{1}{r!} \sum_{k=2}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

用序贯树解 Monty Hall 问题:



不妨没选择门 ①

换前: $1/3$ 换后: $2/3$.

全概率公式: 将 Ω 分割成一组 $\{A_i\}$ (互斥), 则 $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + \dots + P(A_n)P(B|A_n)$.

特别地, $P(B) = P(A)P(B|A) + P(A^c)P(B|A^c)$, 有限并可换成可列并.

例: 袋中有 n 个白球, m 个黑球, 无放回连抽 k 个, 问第 k 次为黑的概率. $\left(\frac{m}{m+n}\right)$

设 A_k 表示第 k 次抽白, 用归纳法: 假定前 A_{k-1} 步都不改变黑球概率.

$$P(A_k) = P(A_1)P(A_k|A_1) + P(A_1^c)P(A_k|A_1^c) = \frac{m}{m+n-1} \cdot \frac{m}{m+n} + \frac{m}{m+n-1} \cdot \frac{n}{m+n} = \frac{m}{m+n}.$$

例: 敏感问题调查

Bayes 准则 (可用于推理, 先验概率, 后验概率)

定理 概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $\{A_i\}$ 是 Ω 的一个分割, 则 $P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B|A_j)}$.

特别地, $P(B) > 0$ 时, $P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(A^c)P(B|A^c)}$.

信息的先后顺序不影响结果, 即 Bayes 准则具有一致性.

理解: 已知 $P(B|A_i)$, $\forall i$, 求 $P(A_i|B)$. (在 B 发生的情况下修正 "信念程度")

某类敏感问题在人群中占比为 p , 现在袋中放入占比为 p_0 的红球和 $q_0 = 1 - p_0$ 的白球, 被调查者取到红球就讲真话, 取到白球就讲假话, 仅回答是/否, 抽到球的颜色也是保密的. 若每个个体回答 "是" 的概率为 p_1 , 求 p_0 .

$$p_1 = q_0 + (p_0 - q_0)p \Rightarrow p = \frac{p_1 - q_0}{p_0 - q_0}. \text{ 实际问题中 } p_1 \text{ 未知, 可以由调查结果近似估计得到.}$$

$|p_0 - q_0|$ 越大, 所得结论越可靠, 但也越不易被调查对象接受.

事件的独立性

定义: 独立性 (independence) 若概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 内, $A, B \in \mathcal{F}$, 若

$$P(A \cap B) = P(A)P(B), \text{ 则称 } A \text{ 与 } B \text{ 相互独立. (或 } P(A|B) = P(A))$$

后者: B 的发生不改变 A 的概率; 前者写成了 AB 对称的形式.

显然, 不可能事件, 必然事件与任何事件独立.

若 A 与 B 独立, 则 A 与 B^c , A^c 与 B , A^c 与 B^c 相互独立. 独立 $\neq$ 互斥.

同一试验, 不同试验都可以有相互独立的事件.

(定义) 条件独立性 (conditional independence) 给定 $C \in \mathcal{F}$, $P(C) > 0$, 若

$$P(A \cap B | C) = P(A | C)P(B | C), \text{ 则称 } A \text{ 与 } B \text{ 在给定 } C \text{ 之下条件独立. (} P_C(A \cap B) = P_C(A)P_C(B) \text{)}$$

相当于更换了概率空间. 注意: 条件独立与独立没有相互蕴含关系, 不能互推.

即若用 $\perp$ 符号表示独立, $A \perp B \leftrightarrow A \perp B | C$.

(定义) 一组事件的独立性 $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 若对任意非空子集 $S \subset \{1, 2, \dots, n\}$, 都有

$$P(\bigcap_{i \in S} A_i) = \prod_{i \in S} P(A_i), \text{ 则称这组事件相互独立.}$$

注意: 任意非空子集可拆为两两相互独立 (可能随数量出错)

(定义) 两两独立性 pairwise independence. $\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\} P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j)$.

例: 某地区某时期每人咽拭子样本中含病毒概率为 p , 混合 100 人样本, 求能检出病毒阳性概率. 记 A_i 为第 i 人咽拭子中含病毒.

$$P(\bigcup_{i=1}^{100} A_i) = 1 - P(\bigcap_{i=1}^{100} A_i^c) = 1 - (1-p)^{100}$$

若 $p = 0.4\%$, 检出概率为 0.33; 若 $p = 0.0004\%$, 则检出概率降至 0.04%.

例 (赌徒破产模型) 甲有本金 a 元, 每局赢的概率是 $1/2$, 无论输赢, 赌注都为 1 元, 输先后也停止赌博, 求甲输光的概率 $q(a)$. 甲决定再赢 b 元后停止.

用递归方式解. 边界 $q(0) = 1$, 模型相当于古典概型. A 表示第 1 局赢, B_k 表示有 k 元本金时输光.

$$q(a+b) = 0. \quad q(k) = P(B_k) = P(A)P(B_{k-1}|A) + P(A^c)P(B_k|A^c)$$

$$q_k = \frac{1}{2}[P(B_{k+1}) + P(B_{k-1})] \Rightarrow q(k) \text{ 为等差数列}, \quad q(n) = 1 + n(q(1) - 1).$$

$$\text{设 } q(a+b) = 1 + (a+b)(q(1) - 1) = 0, \text{ 有 } q(1) - 1 = -\frac{1}{a+b}, \text{ 那么 } q(a) = \frac{b}{a+b}.$$

说明: 本金有限的情况下, 贪心越大, 输光的概率越大; 一直赌下去必定输光.

↑ 严格定义: $(\Omega, \mathcal{F})$ 为可测空间, 若 Ω 上函数 $X(\omega)$ 满足: 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, $\{\omega | X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$, 则称 $X(\omega)$ 为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量.

随机变量

实质: 给每个可能的试验结果分配一个数, 即 $\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数, 可能离散/连续.

(也是映射, 但范围更大; 概率的范围仅限 $[0, 1]$)

随机性来自试验结果的生成, 而不是映射. 同一样本空间可有多多个随机变量.

记自变元为 ω , 有 $X = X(\omega)$, 更多关注经 X 映射后的概率空间 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, P)$. (信念转移)

随机变量的相互独立性: 设 $X_1, \dots, X_n$ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量, 若对任意实数

$x_1, \dots, x_n$ 都有 $P(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n) = P(X_1 \leq x_1) \dots P(X_n \leq x_n)$, 则相互独立.

不是任意函数都能做随机变量 (不一定能分配概率)

要求: (数值化) $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, (可度量) $X^{-1}(A) \in \mathcal{F}$.

(定义) 设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为可测空间, 若 Ω 上函数 $X(\omega)$ 满足: 对 $\forall w \in \mathbb{R}$, $\{\omega | X(\omega) \leq w\} \in \mathcal{F}$, 则称 $X(\omega)$ 为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量 (random variable, rv), 可简记为 X .

性质: $X^{-1}(A \cap B) = X^{-1}(A) \cap X^{-1}(B)$, $X^{-1}(A \cup B) = X^{-1}(A) \cup X^{-1}(B)$, $X^{-1}(A^c) = [X^{-1}(A)]^c$ (交并补不变)

对 $X^{-1}((-\infty, x]) \in \mathcal{F}$: 交并补得到闭区间, 用连续取并逼近得到开区间和孤立点.

全体事件域 $\mathcal{B} = \sigma((-\infty, x]) = \sigma((-\infty, x)) \dots$ 可以通过类似区间生成.

习惯记号: $X, W, Y, Z, \dots$ 或 ε, ξ, η , 表示序列用下标. $\{X \leq x\}$ 代替事件 $\{\omega | X(\omega) \leq x\}$.

Borel 集: 用 C 表示 $\mathbb{R}$ 上左开右闭的子区间全体, $C = \{(a, b]\}$. 令 $\mathcal{B} = \sigma(C)$, 称作 Borel 域.

定理 X 是可测空间上的随机变量, 对任意 Borel 集 A , $\{X \in A\} \stackrel{\text{def}}{=} \{\omega | X(\omega) \in A\} \in \mathcal{F}$.

(对任何 Borel 集 A , $\{X \in A\}$ 都是事件, 于是可计算概率 $P(X \in A)$, 保证了其可测性)

Borel 可测函数定义 (映射到实数轴上的所有正常集合)

定理: 若 X 是可测空间上的随机变量, $g(x)$ 是可测函数, 则 $Y = g(X)$ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量.

构造与生成: 连续函数、阶梯函数、单调函数及它们的线性组合都可测, 多元同理.

四则运算: 求极限 ($\limsup, \inf$), $\max, \min, \sin, e^x$ 等变换; 函数复合不改变可测性.

随机变量的独立性

(定义) $X_1, \dots, X_n$ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量, 若 $\forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ 均有 $P(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n) =$

$P(X_1 \leq x_1) \dots P(X_n \leq x_n)$, 则称其相互独立.

(与之前的独立性相比: 从 S 任意子集切换到全集, 事件 $\rightarrow$ 小于关系)

补充说明 (通过单调+极限证明只需一个集合而非任意子集)

定理: 设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 则对任何 Borel 集 $A_1, \dots, A_n$, 事件

$\{X_1 \in A_1\}, \dots, \{X_n \in A_n\}$ 相互独立.

定义: 若随机变量相互独立且有相同分布函数, 则称其独立同分布 (independent and identically distributed, iid)

定理: 设随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, $g_1(x), \dots, g_n(x)$ 是一元实可测函数, $\varphi(x_1, \dots, x_n)$

是 k 元实可测函数, 则 1° 随机变量 $g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$ 相互独立.

* 2° 随机变量 $\varphi(X_1, \dots, X_k), X_{k+1}, \dots, X_n$ 相互独立.

常见随机变量

离散型随机变量 (discrete rv) 随机变量只取有限个或可列个值.

概率分布列 (probability mass function, PMF): 对离散型随机变量 X , 称

$P(X=x_k) = p_k, k \geq 1$ 为 X 的概率分布, $\{p_k\}$ 为分布列.

分布列性质: $p_k \geq 0, \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$. (由互斥, 可列可加性天然成立)

<1> 两点分布 $B(1, p)$ / Bernoulli 分布:

* $\downarrow$ X 的取值只有 0 或 1, 概率分布 $P(X=1) = p = 1 - P(X=0)$. 记作 $X \sim B(1, p)$ 或 $B(p)$.

* <1> 二项分布 (Binomial 分布): $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, 记作 $X \sim B(n, p)$.

相当于 Bernoulli 分布连续重复 n 次.

若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且都服从 $B(p)$, 则 $S = X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim B(n, p)$.

若 $X_1 \sim B(n_1, p), X_2 \sim B(n_2, p)$, 则 $X_1 + X_2 \sim B(n_1 + n_2, p)$. (要求: X_1, X_2 相互独立)

证明: $P(X+Y=k) = \sum_{j=0}^k P(Y=k-j) P(X=j) = \sum_{j=0}^k \binom{m}{k-j} \binom{n}{j} p^k q^{m-k+n} = \binom{m+n}{k} p^k q^{m-k+n}$.

定理: 二项分布的最大可能值 k_0 存在, 即二项分布的中心项: $b(k_0, n, p) = \max_{0 \leq k \leq n} b(k, n, p)$.

且 $k_0 = \begin{cases} (n+1)p & \text{或 } (n+1)p-1, \text{ 若 } (n+1)p \text{ 为整数} \end{cases}$ (两个最大项)

$\lfloor (n+1)p \rfloor$, 若 $(n+1)p$ 不为整数 (唯一最大项)

* <2> 几何分布 / Geometric 分布

$P(X=k) = (1-p)^{k-1} p, k=1, 2, \dots, X \sim G(p)$. (连续若干次后发生)

定理: 随机变量 $X \sim G(p)$ 的必要条件是无记忆性, 即 $P(X=k+1 | X > k) = P(X=1)$.

(memoryless)
在离散条件下, 无记忆性和几何分布可以互推, 二者等价.

证明) $\Rightarrow: P(X=k+1|X>k) = \frac{P(X=k+1, X>k)}{P(X>k)} = \frac{P(X=k+1)}{P(\bigcup_{j=k+1}^{\infty} X=j)} = \frac{(1-p)^k p}{\sum_{j=k+1}^{\infty} (1-p)^{j-1} p} = p = P(X=1).$

$\Leftarrow: \text{记 } r_k = P(X>k), \{X=k+1\} = \{X>k\} - \{X>k+1\}, \text{ 那么 } P(X=k+1) = r_k - r_{k+1}. r_0 = 1.$

$P(X=k+1|X>k) = 1 - \frac{r_{k+1}}{r_k}, \text{ 代入上界 } P(X=1)=p, \text{ 累加得 } P(X=k) = (1-p)^{k-1} p.$

帕斯卡分布 Pascal distribution

$P(X=k) = \binom{k-1}{r-1} (1-p)^{k-r} p^r, \text{ 直到成功 } r \text{ 次后停止.}$

负二项分布 $NB(r, p)$. 概率分布为 $P(Y=k) = \binom{k+r-1}{r-1} (1-p)^k p^r, k \in \mathbb{Z}. Y$ 是停止时失败次数.

以后帕斯卡分布和负二项分布不再区分. 可以看成若干独立的几何分布之和.

<3> 超几何分布 (Hypergeometric distribution) 无放回, 相当于抽取一组

$P(X=k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, k \leq \min(n, M), \text{ 记作 } X \sim HG(n, M, N).$

应用: 质量检测; 捕获-再捕获模型 (标志重捕法)

理解: N 件产品中有 M 件次品, 抽取 n 件, 其中有 k 件次品的概率. 次品率 $p = \frac{M}{N}$.

在 N 足够大的情况下, 无放回 可以用有放回 (二项分布) 近似.

有放回 $X \sim B(n, \frac{M}{N})$, 无放回 $X \sim HG(n, M, N)$.


<4> 负超几何分布 (Negative Hd)

$P(X=k) = \frac{\binom{k+r-1}{k} \binom{N-k-r}{M-k}}{\binom{N}{M}}, k \leq N-M. X \sim NH(r, M, N).$

例 在包含 N 个元素的集合中有 M 个红球、 $N-M$ 个黑球, 每次无放回地抽取一球, 直到抽到 r 个红球时黑球为 k 个的概率.

先考虑第 $k+r$ 个: $\frac{M}{N}$ 概率为红球, 前 $k+r-1$ 个服从 $HG(k+r-1, M-1, N-1)$ 超几何分布.

以上4种分布满足如下关系.



几何分布 $G(p)$

第一行: 确定抽样数, 求抽中次数; 第二行: 抽中若干次, 求抽取次数.

$T(n, \lambda)$

* <5> 泊松分布 (Poisson distribution)

$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $X \sim P(\lambda)$, 其中 λ 是正常数, $\frac{\lambda^k}{k!}$ 是核项.

以放射性物质为例证明泊松分布: 将时间 t 等分成 n 段, 每段是 $\delta_n = \frac{t}{n}$. n 足够大

假定 1) 在 δ_n 内最多放一个粒子, 且放出的概率为 $p_n = \mu \delta_n = \frac{\mu t}{n}$, μ 为正常数.

2) 各时间段内是否放出粒子相互独立.

定义 $\lambda \triangleq \mu t = n p_n$, 相当于定义为总时间内的平均个数/单位时间内的发生密度.

在上述假定下, 放射性物质放出粒子数 $X \sim B(n, p_n)$.

$$P(X=k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!}{k!} \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n^k} (1-\frac{\lambda}{n})^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

二项分布可用 Poisson 分布近似 (n 很大, p 很小时) 特别是在 n 无法确定的情况下.

也不一定限制在一定时间内, 如一张纸上的两点数.

连续型随机变量

(定义) 对随机变量 X , 若存在非负函数 $f(x)$ 使得对任意 $a < b$, (相当于信余分布),

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x) dx, \text{ 则称 } X \text{ 是连续型随机变量 (continuous rv), 称 } f(x) \text{ 是}$$

X 的概率密度函数, 简称概率密度或密度 (probability density function, PDF)

$$f(x) \text{ 性质 } 1^\circ \text{ 归一性 } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

$$2^\circ \text{ (单点) } P(X=a) = 0. \text{ 推论: } P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b).$$

$$3^\circ \text{ 对任意的 Borel 集 } A, \text{ 有 } P(X \in A) = \int_A f(x) dx.$$

理解连续性: $X(\omega)$ 不是连续函数, 因为其样本空间无拓扑结构, 不构成连续性.

$f(x)$ 也可能不是连续函数. 连续性随机变量指它的分布函数绝对连续.

PDF 在其定义域内未必有界, 如 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 也是密度函数.

常见连续型随机变量

$$<1> \text{ 均匀分布 } U(a,b): f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in (a,b) \\ 0, & x \notin (a,b) \end{cases} \quad X \sim U(a,b). \quad U \rightarrow \text{uniform}.$$

$$\text{还可以写成示性函数 } f(x) = \frac{1}{b-a} I_{(a,b)} = \frac{1}{b-a} I_{x \in (a,b)}.$$

对任意 Borel 集 A , 若 A 的测度 $m(A) = \int_A 1 dx < \infty$, 可以类似定义 A 上的均匀分布,

$$\text{若 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{m(A)}, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases} \quad X \sim U(A). \text{ 对任意的其它 Borel 集 } B,$$

$$P(B) = \frac{m(A \cap B)}{m(A)} \quad (\text{可以用测度转化})$$

<2> 指数分布 (列发生某个事件所用时间)

$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$ λ 为正常数, $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $\text{Exp} \rightarrow \text{Exponential}$. 均值为 $\frac{1}{\lambda}$.

当作示性函数: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} I_{(0, +\infty)} = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$. 或 $f(x) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} I_{(0, +\infty)}$.

X 超过某个值的概率随值增加指数递减, 与几何分布非常相似.

定理: 连续型随机变量 X 服从指数分布的充要条件是 X 无记忆性.

即 $\forall s, t \geq 0$, 有 $P(X > s+t | X > s) = P(X > t)$.

(证明) $\Rightarrow: X \sim \text{Exp}(\lambda), P(X > x) = \int_x^{\infty} \lambda e^{-\lambda y} dy = e^{-\lambda x}$;

$$P(X > s+t | X > s) = \frac{P(X > s+t)}{P(X > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(X > t)$$

$\Leftarrow: \text{令 } G(x) = P(X > x), G(s+t) = G(s)G(t) \text{ 即 } \log G(s+t) = \log G(s) + \log G(t). \log G(x) = \log G(x) \cdot x.$

$G(x)$ 单调非增, $\lambda = -\log P(X > 1)$. $P(a < X \leq b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b} = \int_a^b \lambda e^{-\lambda y} dy$.

失效率: 单位时间内失效的概率. $\lambda = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t < X \leq t+\Delta t | X > t)}{\Delta t} = \lambda$.

由定义, $\lambda \triangleq \mu t$. 如失效 6/h, 等价于 10/min, 其实是线性的尺度转换.

若 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $Y = \lambda X$, 那么 $Y \sim \text{Exp}(1)$. λ 称为尺度参数. (不同坐标系) rate parameter.

指数分布描述的是无老化时的寿命分布, 是一种近似.

<3> 正态分布 Normal distribution.


(一般) 正态分布: $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2})$, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

特别地, 当 $X \sim N(0, 1)$ 时, X 服从标准正态分布: $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{x^2}{2})$.

密度函数性质: (又称为钟型分布) 如右图.

关于 $x = \mu$ 对称, $x = \mu \pm \sigma$ 处有拐点.

$f(x)$: $x = (\sigma\sqrt{2\pi})^{-1}$ 处取最大值.



<4> 其他连续型随机变量介绍

问题: PMF 和 PDF 不能相互转换.

· 概率分布函数: 对随机变量 X , 定义 $F(x) = P(X \leq x)$, $x \in \mathbb{R}$.

为 X 的(概率)分布函数, 累积分布函数 (cumulative distribution function, CDF)

CDF 与 PMF: 阶跃式函数, 一定要画出端点的空心圆. 两者可以相互唯一确定.

$$p_k = P(X = x_k), F(x) = P(\bigcup_{j: x_j \leq x} \{X = x_j\}) = \sum_{j: x_j \leq x} p_j.$$

CDF与PDF: $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$, $x \in \mathbb{R}$. ($f(x)$ 可以不连续)

$F(x)$ 是连续函数,且在 $f(x)$ 的连续点有 $f(x) = F'(x)$, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的分布函数.

PDF可以唯一确定CDF,但CDF不能唯一确定PDF(除非 $f(x)$ 连续)

标准正态分布: (专用符号 $\phi(x)$, $\Phi(x)$) $\phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(t)dt = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$.


由对称性, $\phi(x) + \phi(-x) = 1$, 没有解析解,参考正态分布表.

对一般的正态分布: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $P(X \leq a) = \Phi(\frac{a-\mu}{\sigma})$.

3 σ 准则: $P(|X-\mu| \leq 3\sigma) = 99.73\%$.

双向互推: CDF $\leftrightarrow$ PDF, PMF $\leftrightarrow$ PDF. PDF可推CDF, $f(x)$ 连续时CDF可推PDF.

例(CDF作用) 抛均匀硬币, 正面直接得0.5元, 反面转转盘得0到1元的均匀分布.



分布函数的性质: 1° $F(x)$ 单调非降

2° $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.

3° $F(x)$ 是右连续的.

可通过CDF直接判断分布的类型和随机变量的类型.

若CDF中有单点概率不为0情况, 则对应变量一定不是连续型随机变量.

若对 $\forall x \in \mathbb{R}$ 都有 $P(X=x) = 0$, 则 $F(x) = P(X \leq x)$ 是连续的. (若 F 不连续)

定理: 设 X 的分布函数 $F(x)$ 连续, 数集 A 中任两点之间距离大于某正数 δ .

若在 A^c 上 $F'(x)$ 存在且连续, 则 X 的密度函数: $f(x) = \begin{cases} F'(x), & x \notin A \\ 0, & x \in A \end{cases}$.

(数集 A 相当于若干离散单点).

(证明) $\forall a < b$, 不妨设 $a_0 = a < a_1 < \dots < a_k < b = a_{k+1}$, (a, b) 中只含 A 中的 $a_1, \dots, a_k$.

此时 $P(a < X \leq b) = \sum_{j=0}^k P(a_j < X \leq a_{j+1}) = \sum_{j=0}^k [F(a_{j+1}) - F(a_j)] = \sum_{j=0}^k \int_{a_j}^{a_{j+1}} f(t)dt = \int_a^b f(t)dt$.

此时 $f(x)$ 是 X 的概率密度.

说明: F 连续不能保证 X 是连续型随机变量, 但 F 不连续时 X 一定不是连续型.

(反例) 若 F 是二项分布的随机变量的分布函数时, 除有限个 γ 点外, $F'(x) = 0$, 所以

此时 X 的密度不存在.